



تاريخ الأمتحان – الأحد 16-6-2013م



نموذج اجابة

جامعة بنها

كلية الآداب

الفرقة الرابعة

قسم /الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
عدد صفحات الأختبار(5 صفحات)

زمن الأختبار (3 ساعات)

المادة / حوض النيل

عدد صفحات الأسئلة (5- صفحات)

نموذج رقم (1)

ملحوظة هامة (برجاء كتابة رقم النموذج على ورقة الأجابة)

أختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2013/2012 م)

أجب عن جميع الأسئلة التالية :

أولاً : أسئلة اختيار من متعدد من (1- 40) (10 درجات)

1- يبلغ طول رحلة نهرا لنيل عبر الصحراء الإفريقية دون زيادة في مياهه مسافة مقدارها :

أ- 2700 كم

2- تشترك دول تنزانيا- كينيا – أوغندا في إحتواء بحيرة :

ج- فكتوريا

3- يقع خليج كافرندو- وميناء كسيوفو في دولة :

أ- كينيا

4- يبلغ طول نهر المسيسيبي ورافده المسوري حوالي :

ب- 6860 كم

5- من الأسباب التي أدت لزيادة كمية المياه في بحيرة فكتوريا :

ج- كل ما سبق

6- الجبال التي تشمل خط تقسيم المياه ما بين نهر النيل ونهر الكونغو هي :

أ- جبال مغمبيرو

7- تتصل بحيرة كيوجا مع بحيرة البرت بواسطة نيل ألبرت عند شلالات :

ج- مرشيزون

8- يبلغ متوسط التصريفات السنوية للنيل عند أسوان حوالي :

أ- 84مليارم³

9- إقترح بناء سد سنار على النيل :

ج- الأزرق

10- يصب نهر (الكاجيرا) في بحيرة :

ب- فكتوريا

11- بدأت المرحلة الأولى من إنشاء (سد أسوان) في عام :

ب- 1900م

12- كان من المقترح إقامة سد على بحيرة فكتوريا – ضمن التخزين القرني لرفع مستوى مياه البحيرة إلى:

أ- 1 متر

13- المشروع الذي كان سيحول مياه النيل في منطقة إقليم السد ، منعاً لضياع المياه في المستنقعات هو :

ب قناة جونجلي

14- المشروع الذي لو تحقق تنفيذه كان سيققل من خطر تركيز التخزين في منطقة واحدة من النيل هو خزان :

أ- بحيرة تانا

15- يضم التقسيم الإداري للسودان عدة ولايات – يبلغ عددها :

ب- 17 ولاية

16- تقوم صناعة الزيوت في السودان على انتاج محاصيل :

أ- السمسم والفول السوداني

17- تعتبر تربة اللاتريت - غنية بعناصر أكاسيد :

ب- الحديد

18- تنتمي غابة (أيتوري) لإقليم الغابات :

ب- الاستوائية

19- يتميز الإقليم الواقع ما بين بحيرة فيكتوريا وبحيرة ادوارد بوجود حشائش جبلية موسمها :

ج- طوال العام

20- من أنواع النباتات المستديمة في نباتات الصحاري :

أ- الصبار والظرفاء

21- بعد بناء السد العالي وخلو المياه من الرواسب ، أصبح لدى المياه في المجرى بعد السد :

أ- قدرة على النحت

22- بعد بناء السد العالي -بلغ معدل نحر النهر النوعي في المنطقة المحصورة ما بين أسوان وأسنا حوالي :

ج- 2.2 سم

23- قبل بناء السد العالي كانت الرمال التي تحملها رياح الخماسين تتراكم على جانب النيل :

ج- الغربي

24- أوضحت دراسة الصور الجوية لبحيرة ناصر وجود عدد كبير من الكثبان الرملية في منطقة الشلال :

ج- الثاني

25- من الأسباب التي ادت إلى تآكل الشواطئ الشمالية لمصر :

أ- نقص الرواسب النهرية وزيادة النحر

26- وجود بقايا القلاع التي بنيت في العصر التركي وغمرت الآن بالمياه دليل على :

ج- جميع ما سبق

27- من المحاصيل التي أدت زراعتها لارتفاع منسوب الماء الأرض في التربة المصرية محصول :

ب- الأرز

28- أوضحت الدراسات ارتفاع نسبة الأيونات الذائبة الحمضية في مياه النهر عن الحد المسموح .ومنها :

ج- البيكربونات

29- تمتد بسطة بحيرة ألبرت - حتى بلدة نيمولي على الحدود :

أ- الأوغندية السودانية

30- يوجد فائق أسوا - ضمن الإقليم المورفولوجي المعروف باسم :

ج- هضبة البحيرات الاستوائية

31- تبلغ المساحة الإجمالية لدلتا النيل حوالي :

أ- 22 ألف كم

32- يحد دلتا نهر النيل من جهة الغرب جبل :

ج- أبو رواش

33- ساعدت مياه البحر المالحة في تكوين الدلتا من خلال :

أ- إندماج جزينات الطمي

34- امتدت حافة الدلتا القديمة من رأس خليج السويس في الشرق حتى :

أ- وادي النظرون غرباً

35- تكونت جبهة الدلتا الحالية وهي على شكل قوسي مع قدوم نهر :

أ- ما قبل النيل

36- تغير شكل بحيرة البردويل-شمال سيناء- دليل على حدوث :

ب- هبوط الدلتا

37- فرع النيل القديم الذي يمتد تحت مياه خليج أبو قير حالياً هو الفرع :

ب- الكانوبي

38- يرى ليونز - أن الانخفاض في الدلتا قديماً اتجه من :

أ- الشرق للغرب

39- امتدت دلتا النيل داخل البحر بشكل ملحوظ في العصر الحديث في الفترة ما بين القرنين :

ج- السادس عشر والتاسع عشر

40- يرى كلاً من ويلكوكس وكريج - أن قاع النيل قابل للتغير خاصة في أثناء :

ج- الفيضان

ثانياً : أسئلة الصواب والخطأ من(41-80) (10 درجات)

41- طول رحلة نهر النيل عبر الصحراء تؤدي إلى إرساب حمولته في دلتا داخلية قبل المصب . خطأ

42- توجد المنابع الصيفية الموسمية لنهر النيل في إثيوبيا . صواب

43- تقل مساحة حوض نهر النيل عن مساحة حوض نهر الكونغو . صواب

44- يمد النيل الأزرق نهر النيل بحوالي 26مليار م³ من المياه سنوياً . خطأ

45- ترجع نشأة البسطات - الي أزمة التجمد في عصر البليستوسين . خطأ

46- ترتبط نشأة بحيرة كايوجا- بالحركة المكونة للاخدود الإفريقي العظيم . صواب

47- لا يزيد اكبر أعماق بحيرة فكتوريا على 100 متر . صواب

48- اتصلت بحيرة فكتوريا بنهر النيل منذ حوالي 15 الف سنة . خطأ

49- في رأي علمي - تكونت بعض سواحل فلسطين الجنوبية من الرواسب النيلية . صواب

50- تقع بسطة وادي حلفا النيلية - في منطقة غزيرة المطر . خطأ

51- من مقترحات مشروعات التخزين القرني بناء سد خشم القربة على نهر العطرة . صواب

52- تمتد البسطة الرابعة من بسطات نهر النيل ما بين جوبا إلى الخرطوم . صواب

- 53- من مميزات مشروعات التخزين القرني على البحيرات السماح لمعظم الرواسب بالتدفق دون عائق أو حاجز. صواب
- 54- من مشروعات التخزين القرني - إقتراح بناء خزن موسمي على بحيرة ألبرت عند بلدة (مروي) السودانية . خطأ
- 55- صاحب فكرة بناء السد العالي في مصر هو الفرنسي - فرديناد دليسبس . خطأ
- 56- تحويل مجرى النهر وبناء سدين بعرض المجرى لكشف القاع هي المرحلة الثانية في مراحل بناء السد العالي . خطأ
- 57- بدأ خزان بحيرة ناصر في الإمتلاء بالمياه عام 1971م . خطأ
- 58- تمتد بحيرة ناصر لتشمل جزء من النوبة السودانية . صواب
- 59- تم تهجير سكان النوبة السودانية بعد بناء السد العالي إلى مصر . خطأ
- 60- تختلف خصائص المياه في سطح بحيرة ناصر عن المياه في قاعها . صواب
- 61- اثبتت الدراسات العلمية أن جسم السد العالي سوف يتأثر بالهزات الأرضية في منطقة بناوه . خطأ
- 62- يؤثر إختلاف درجة شفافية المياه وحجم العكارة في مياه بحيرة ناصر على الإنتاج السمكي بالبحيرة . صواب
- 63- لا توجد علاقة وثيقة ما بين بناء السد العالي وتجريف التربة المصرية لصناعة الطوب . خطأ
- 64- توجد علاقة طردية بين بناء السد العالي وزيادة خصوبة التربة المصرية . خطأ
- 65- يرى (رشدي سعيد) أن تآكل سواحل مصر الشمالية سببه إرتفاع منسوب سطح البحر العالمي . صواب
- 66- تقل نسبة ملوحة التربة في شمال الدلتا وتزيد كلما اتجهنا جنوباً . خطأ
- 67- تزيد معدلات الأمطار الشتوية في العالم عن معدلات الأمطار الصيفية . خطأ
- 68- يتبع نهر النيل في إحداره من الجنوب إلى الشمال الإندثار العام لهضبة شمال إفريقيا . صواب
- 69- تختلف بحيرة فكتوريا عن باقي بحيرات الإخدود الإفريقي بأن لها شواطئ مسطحة . خطأ
- 70- يرى العالم (جون بول) تكون بحيرة هائلة قديماً في منطقة مستنقعات السودان . صواب
- 71- يعتبر معدل نمو الدلتا المصرية سريعاً مقارنة بدلتاوات أخرى. خطأ
- 72- توضح خرائط دلتا النيل في كتاب وصف مصر- وجود عدد كبير من البحيرات على الضفة اليمنى لفرع دمياط . صواب
- 73- تكونت دلتا فجر النيل من رواسب خشنة . صواب
- 74- بسبب هبوط الدلتا قديماً ظهرت جزيرة أنترووس - الواقعة شرق ميناء الإسكندرية . خطأ
- 75- يعد فرع رشيد الحالي ممثلاً للفرع الفاتنيتي - القديم . خطأ
- 76- تطورت فروع الدلتا الغربية أكثر من فروعها الشرقية بعد حركة الإنخفاض . صواب
- 77- توجد علاقة طردية في رأي (رشدي سعيد) بين إنطماش فروع الدلتا القديمة وضعف الحكومات المصرية القديمة
- 78- يرجع السبب في اطماء الأفرع الغربية لدلتا النيل إلى نمو الحشائش البرية بسبب الإهمال . خطأ
- 79- تؤثر منطقة الضغط المرتفع الأزوري على مناخ حوض النيل بتلطيف درجة حرارتها . صواب
- 80- منطقة الرهو الأستواني - تؤدي إلى زيادة كمية الأمطار الشتوية في حوض النيل . خطأ

ځالص تمنڤاآا بالآوفاق

أءء اءراآ عراب باشا

-5-